

PRX-T₃₃（マッサージピール）治療同意書

- ① PRX-T₃₃ は TCA（トリクロロ酢酸）、低濃度過酸化水素、コウジ酸が配合された製剤です。
- ② TCA が真皮深くに浸透し、線維芽細胞を活性化させることによりコラーゲンが増生され、肌にハリや弾力をもたらします。また、コウジ酸のメラニン生成抑制作用によりシミやくすみを改善します。
- ③ 過酸化水素の働きにより、皮膚表面のピーリング作用が抑えられ、刺激感がほとんどなく、赤みや皮ムケなどが起こりにくいのが特徴です。
- ④ 仮に赤みが出現しても通常はすぐに治まりますが、数日後に薄皮が剥けることがあります。
- ⑤ 直径 1 ～ 2 mm の白い丘疹（稗粒腫に似た白いブツブツ）が出現することがあります。症状は 1 時間ほどで改善しますが、薄皮が剥けることがあります。
- ⑥ 赤みや皮ムケが生じた場合は、紫外線予防（UV ケア）、保湿を行い、必要に応じてステロイドなどの抗炎症剤を塗布します。
- ⑦ かさぶたができた場合は落屑するまで剥がさないでください。無理に剥がすと色素沈着や瘢痕の原因となることがあります。
- ⑧ 刺激に弱い目の周り（特に目尻）、小鼻、法令線付近、口周り（特に口角）、傷のある部位は肌の状態により治療を避ける場合があります。
- ⑨ 配合成分に対する過敏症、妊娠、授乳中、重度の敏感肌、強い炎症（アトピーやかぶれなど）、脂漏性皮膚炎の部位、ヘルペス治療中、日光過敏症の方は安全性の観点より治療が受けられません。
- ⑩ トレチノインや過酸化ベンゾイルを使用されている方は治療前後 2 週間の使用を控えて下さい。
- ⑪ 2-3 週間おきに 5 回の治療が 1 クールの目安です。1 ヶ月ほど肌を休ませた後、メンテナンスとして 1-2 ヶ月に 1 回の治療をお勧めします。
(肌の状態によりメンテナンス前にさらに 1 クールの治療をお勧めする場合があります)
- ⑫ お肌に異常がなければ、治療当日より洗顔やメイクが可能です。が、こすらないようにしてください。また、ホームケアとして紫外線予防（UV ケア）、保湿、必要に応じて抗炎症剤を塗布してください。治療後は乾燥を伴うため、効果を高めるためにも保湿は入念に行ってください。

* 以上は一般的な留意事項であり、症状等には個人差が生じる旨、ご理解いただきますようお願い致します。

上記の内容に関して十分な説明を受け理解致しました。また、不明な点に関しては質問をする機会がありました。よって、PRX-T₃₃ 治療を受けることに同意致します。

年 月 日

氏名

印